

แนวปฏิบัติรายการยาฉุกเฉินโรงพยาบาลเทพา

๑.ยาฉุกเฉิน (Emergency Drug)

หมายถึง ยาที่ใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะระบบหัวใจ และหลอดเลือดล้มเหลว เพื่ออย่างรุนแรง มีอาการชัก หรือหมดลมหมดเกร็งซึ่ง ****ต้องได้รับยาทันทีหลังมีคำสั่งใช้ยา**** เพราะ อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ได้แก่

- Adrenaline Injection ๑mg/๑ml
- Adenosine Injection ๖mg/๒ml
- Amiodarone injection ๑๕๐ mg/๓ ml
- Atropine Injection ๐.๖ mg/ml
- Calcium Gluconate Injection ๑๐๐ mg/๑๐ ml
- ๕๐% Dextrose Injection ๒๕g/๕๐ ml
- Diazepam injection ๑๐ mg/๒ ml
- Dopamine Injection ๒๕๐ mg/๑๐ ml
- ๕๐% Magnesium Sulfate Injection
- Norepinephrine Inj (๔mg/๔ml)
- ๗.๕% Sodium Bicarbonate Injection

แนวทางปฏิบัติ

(๑) แพทย์สั่งใช้ยาโดยระบุ Stat และแจ้งพยาบาล

(๒) พยาบาลใช้ยาจากรถEmergency / หรือ CPR Drug Box

(๓)การเบิกยา ให้ส่ง CPR DRUG BOX เพื่อเปลี่ยนกล่องใหม่

ผู้ป่วยนอก เขียน ชื่อ HN มาที่ป้าย หุคกล่อง CPR BOX

ผู้ป่วยใน แนบ ใบ Copy ของ Doctor order cheet มาด้วย

๒.ยาที่ต้องให้ทันที (Stat Drug) เพื่อแก้ไขอาการอย่างเร่งด่วน

หมายถึง ยาที่จำเป็นต้องได้รับอย่างเร่งด่วน แต่ไม่ฉุกเฉิน (Emergency drug) หากไม่ได้รับยา จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

****ต้องได้รับภายใน ๑๕-๓๐ นาที**** หลังมีคำสั่งใช้ยา ได้แก่

- Amlodipine ๕ mg Tab
- Aspirin ๘๑ mg Tab /
- Captopril ๒๕ mg Tab
- Charcoal ๕๐ g
- Clopidogrel ๗๕ mg Tab
- Dexamethasone Injection ๔mg/ml
- Acetylcysteine ๒๐๐ mg /ซอง เฉพาะ Paracetamol Toxic*
- Furosemide Injection ๒๐ mg/๒ ml หรือ Furosemide Injection ๒๕๐ mg/๒๕ ml
- Hydralazine Injection ๒๐ mg/amp

- Haloperidol Injection
- Hydrocortisone Injection
- Isosordil Sublingual ๕ mg
- Kalimate หรือ K exalate
- Morphine Injection ๑๐ mg/ml
- Pethidine Injection ๕๐ mg/ml
- Phenytoin Injection ๒๕๐ mg/ml
- Regular Insulin
- Ipratropium Nebule
- Salbutamol Nebule
- ยา Antibiotic ที่ใช้กรณี เป็น Septic Shock

แนวทางปฏิบัติ

- (๑) แพทย์สั่งใช้ยาโดยระบุ Stat และแจ้งพยาบาล
- (๒) พยาบาลสามารถใช้ยาที่สำรองบนหอผู้ป่วย (Ward Stock) หรือ เบิกยาค่วนจากห้องยา
- (๓) หากเบิกยาให้เภสัชกรจ่ายยาใน ๑๕ นาที
- (๔) กรณีเบิกยาคืน ให้ส่ง copy ของ Docter order sheet ตามปกติ
- (๕) กรณีเบิกยาค่วนให้ทำเครื่องหมาย ให้เห็นเด่นชัด ในยาที่ขอรับค่วน

๓ ยา PRN หรือ ยา Stat Drug ที่ไม่ต้องรอรอบปกติ

ผู้ป่วยควรได้รับยาภายใน ๑ ชั่วโมง หลังมีคำสั่งใช้ยา ได้แก่
ยา Antibitotc กรณีติดเชื้อไม่รุนแรง

- Ceftazidime Injection
- Ceftriazone Injection
- Cloxacillin Injection
- Cefazolin Injection
- Chlorpheniramine inj ๔ mg/ml
- Diclofenac Injection ๗๕ mg/๓ ml
- Hyoscine Injection ๑๐ mg/ml
- Metoclopramide Injection ๑๐ mg/ ๒ml
- Potassium Chloride Injection ๒๐ Meq/๑๐ ml
- Tramadol Injection ๑๐๐ mg/ml

แนวทางปฏิบัติ

- (๑) แพทย์เขียนคำสั่งใช้ยาโดยระบุวิธีให้ยาแบบ Stat
- (๒) พยาบาลเบิกยาค่วนจากห้องบริการจ่ายยา
- (๓) เภสัชกรทำการจ่ายยาภายใน ๓๐ นาที