

บัญชียาโรงพยาบาลเทพา



กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

สารบัญ

ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ED	หน้า
กลุ่มยา 1 Gastro-intestinal system	1
กลุ่มยา 2 Cardiovascular system	2
กลุ่มยา 3 Respiratory system	5
กลุ่มยา 4 Central nervous system	6
กลุ่มยา 5 Infection	10
กลุ่มยา 6 Endocrine system	15
กลุ่มยา 7 Obstetrics,gynaecology,and urinary-tract disorders	16
กลุ่มยา 8 Malignant disease and Immunosuppression	16
กลุ่มยา 9 Nutrition and blood	17
กลุ่มยา 10 Musculoskeletal and joint diseases	20
กลุ่มยา 11 Eye	21
กลุ่มยา 12 Ear,nose,and oropharynx	22
กลุ่มยา 13 Skin	22
กลุ่มยา 14 Immunological products and vaccines	23
กลุ่มยา 15 Anasesthesia	23
กลุ่มยา 16 Antidotes	24
กลุ่มยา 17 Contrast medias and Radiopharmaceuticals	25
บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร	26
ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ NED	27

กลุ่มยา 1 Gastro-intestinal system**1.1 Antacids and other drugs for dyspepsia**

-Simethicone	-Tablet 80 mg	ก
	-Sus 40 mg/0.6 ml in 15 ml	ก
-Carminative	-Mixture 180 ml	ก
	-Mixture 450 ml	ก
Each 15 ml contain		
	Compound Cardamon Tinct 1.8 ml	
	Weak Ginger Tinct 0.12 ml	
	Capsicum Tinct 0.12 ml	
-Aluminium hydroxide	-Tablet 500 mg	ข

1.2 Antispasmodics and other drug altering gut motility

-Domperidone	-Tab 10 mg	ก
	-Sus 5 mg/ml 30 ml	ก
-Hyoscine-n-butylbromide	-Tab 10 mg	ก
	-Syr 5 mg/5 ml 30 ml	ก
	-Inj 20 mg/ml	ก
- Metoclopramide	-Inj 10 mg/2 ml	ก

1.3 Uicer-healing drugs and druge used in variceal bleeding

- Omeprazole	-EC Cap 20 mg	ก
	- Inj. 40 mg	ข

1.4 Druge used in acute diarrhea

เมื่อผสมน้ำแล้วมีตัวยาสำคัญต่อลิตรดังนี้

-Sodium Chloride	2.6 g	-Potassium Chloride	1.5 g
-Trisodium Citrate dehydrate	2.9 g	-Glucose	13.5 g
สารละลายนี้มี Molar Concentration ดังนี้			
-Glucose	75 mEq	-Potassium	20 mEq or mmol
-Sodium	75 mEq or mmol	-Citrate	10 mmol
-Chloride	65 mEq or mmol	-Osmolarity	245 mOsm

- Oral rehydration salts	-Oral pdr	ก
Each Sachet contain		
	Sodium Chloride	0.875 g
	Trisodium Citrate Dihydrate	0.725 g
	Potassium Chloride	0.375 g

Glucose Anhydrous	5.000 g		
-------------------	---------	--	--

1.5 Drugs used in chronic bowel disorders

1.6 Laxatives

- Magnesium hydroxide (MOM)	-Sus 8% 60 ml	ก	
- Lactulose	-Syr 100 ml	ข	

1.7 Local preparation for anal and rectal disorders

- Local anaesthetic+Corticosteroids	-Rectal Sup		หนึ่งรูปแบบให้เลือก 1 สูตร
+ with/without Astringent			

เงื่อนไขสำหรับยา Local anaesthetic + Astringent with/without Anti-inflammatory agent ข

1.หนึ่งรูปแบบให้เลือก 1 สูตร

2.ใช้ไม่เกิน 7 วัน

-Proctosedyl

Each suppo contain

Hydrocortisone BP 5 mg

Cinchocain HCl BP 5 mg

1.8 Drugs affecting intestinal secretion

กลุ่มยา 2 Cardiovascular system

2.1 Positive inotropic drugs

- Digoxin	-Tab 0.25 mg	ก	
-----------	--------------	---	--

2.2 Diuretics

- Furosemide	-Tab 40 mg	ก	
	-Inj 20 mg/2 ml	ก	
- Hydrochlorothiazide	-Tab 25 mg	ก	
- Mannitol	-Sol 250 ml	ก	(ยาเบิก รพ.สงขลลา-Service Plan)
- Spironolactone	-Tab 25 mg	ก	
- Amiloride hydrochloride+	-Tab(เลพาฯ 5+50 mg)	ข	

2.3 Anti-arrhythmic drugs

-Adenosine Inj.	-Inj.6 mg/ 2 ml	ก	
-----------------	-----------------	---	--

เงื่อนไข

1.

2.

3.

-Amiodarone Inj.	-150 mg/3 ml	ก	
------------------	--------------	---	--

เงื่อนไข Supraventricular & ventricular arrhyth..

ชื่อยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
-Atropine sulfate	-Inj 0.6 mg/ml	ก	
เงื่อนไข ใช้สำหรับ Supraventricular arrhythmias			
- Lidocaine hydrochloride	-Inj 2% 50 ml (20 mg/ml)	ก	ใช้สำหรับ ventricular arrhythmias
- Magnesium Sulfate	-Inj.50% in 2 ml	ก	
	-Inj.10% in 10 ml	ก	
ใช้สำหรับ ventricular tachycardia, refractory supraventricular tachyarrhythmias			

2.4 Beta-adreceptor blocking drugs

- Atenolol	-Tab 50 mg	ก	
- Metoprolol tartrate	-Tab 100 mg	ก	
- Propranolol hydrochloride	-Tab 10 mg	ก	
	-Tab 40 mg	ก	
- Carvedilol	-Tab 6.25 mg	ก	
	-Tab 12.5 mg	ก	

เงื่อนไข ใช้สำหรับ heart failure with reduced ejection fraction

2.5 drugs affecting the renin-angiotensin system and some other antihypertensive drug

2.5.1 Vasodilator antihypertensive drugs

- Hydralazine hydrochloride	-Tab 10 mg	ก	
	- Tab 25 mg	ก	
	- Inj.20 mg	ก	

ใช้สำหรับ Hypertension emergencies ในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งหมายถึงภาวะที่มี target organ damage (TOD) eg hypertensive encephalopathy , acute pulmonary edema , eclampsia เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีความดัน diastolic ตั้งแต่ 120-130 mmHg และควรใช้ยาฉีดในการรักษา

2.5.2 Centrally acting antihypertensive drugs

-Methyldopa	-Tab 250 mg	ก	
-------------	-------------	---	--

ใช้สำหรับรักษาความดันเลือดสูงในหญิงตั้งครรภ์

2.5.3 Alpha-adrenoceptor blocking drugs

- Doxazosin	-Cap 2 mg	ก	
- Prazosine hydrochloride	-Tab 1 mg	ข	
	-Tab 2 mg	ข	

2.5.4 Angiotensin-converting enzyme inhibitors

-Captopril	-Tab 25 mg	ก	
------------	------------	---	--

ใช้สำหรับ hypertensive urgency กรณีที่สถานพยาบาลไม่มียาฉีด หรือไม่สามารถใช้ยาฉีดในการรักษา hypertensive emergencies อาจพิจารณาใช้ captopril เป็นทางเลือกในการรักษา

- Enalapril maleate	-Tab 5 mg	ก	
	-Tab 20 mg	ก	

2.5.5 Angiotensin -II receptor antagonists

ชื่อยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
-Losartan potassium	-Tab 50 mg	ข	
ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ยาในกลุ่ม ACEI ไม่ได้ เนื่องจากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในกลุ่มดังกล่าว			
2.6 Nitrates,calcium-channal blockers and other vasodilators			
2.6.1 Nitrate			
- Isosorbide dinitrate	-Tab 10 mg	ก	
	-Sublingual tab 5 mg	ก	
2.6.2 Calcium-channal blockers			
ยากลุ่มนี้ชนิดที่เป็น short-acting dihydropyridine(เช่น infedipine immadiate release)ไม่แนะนำให้ใช้รักษา essential hypertention,hypertensive emergencies, hypertensive urgency และ angina pectoris เนื่องจากมียาอื่นที่ปลอดภัยกว่า			
- Amlodipine besilate	-Tab 5 mg	ก	
- Verapamil hydrochloride	-Tab 40 mg	ก	
ใช้สำหรับ ishemic heart disease (IHD)			
- Lercanidipine HCl	-Tab 20 mg	ข	
ใช้สำหรับเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่ทนต่อผลข้างเคียงของยา amlodipine ไม่ได้			
- Nifedipine	- SR Tab 20 mg	ง	
- Nicardipine	- Inj.10 mg/10 ml	ก	
- Nifedipine	- SR Tab 20 mg	ง	
1.ใช้สำหรับความดันเลือดสูงในหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้ methyldopa และ hydralazine แล้วไม่ได้ผล			
2.ใช้สำหรับ intractable Raynuad's phenomenon			
2.6.3 Other vasodilators			
2.7 Sympathomimetics			
2.7.1 Inotropic sympathomimetics			
- Dopamine hydrochloride	-Inj 250 mg/10 ml	ก	
2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics			
-Noradrenaline hydrochloride	-Inj 4 mg/4 ml	ก	
2.7.3 Druge used in cardiopulmonary resuscitation			
- Epineprin(Adrenaline)	-Inj 1 mg/ml (1:1000)	ก	
2.8 Anticoagulants			
- Heparin sodium	-Inj.25,000 U/5 ml	ก	
- Warfarin	- Tab 2 mg	ก	
	- Tab 3 mg	ก	
	- Tab 5 mg	ก	
2.9 Antiplatelet drugs			
- Aspirin	-EC Tab 81 mg	ก	
	-EC Tab 325 mg	ก	
- Clopidogrel	- Tab 75 mg	ก	

ชื่อยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
มีเงื่อนไข 4 ข้อ			
2.10 Fibrinolytic drugs			
-Streptokinase	-Inj.1.5 mu	ก	
2.11 Hemostatics			
2.12 Lipid-regulating drugs			
-Gemfibrozyl	-Cap 300 mg	ก	
	-Tab 600 mg	ก (ยาเฉพาะคนไข้ ARV)	
- Simvastatin	-Tab 10 mg	ก	
	-Tab 20 mg	ก	
-Atorvastatin	-Tab 40 mg	ข	
มีเงื่อนไข 5 ข้อ			
กลุ่มยา 3 Respiratory system			
3.1 Bronchodilators			
3.1.1 Adrenoceptor agonists			
- Salbutamol sulfate	-Tab 2 mg	ก	
	-Syr 2 mg/5 ml 60 ml	ก	
	-MDI 200 ug/Puff	ก	
	-SDU 2.5ml	ก	
	-Sol 0.5% Bot 20 ml	ก	
- Terbutaline sulfate	-Inj 0.5 mg/ml	ก	
3.1.2 Compound antimuscarinic bronchodilators			
- Ipratropium bromide+	-Sol for nebulizer (0.25 mg+0.50 mg)/ml	ก	
Fenoterol hydrobromide	in 20 ml		
- Tiotropium Br	-DPI 18 ug	ก	
3.1.3 Theophylline			
- Theophylline	-Tap SR 200 mg	ก	
3.2 Corticosteroids			
- Budesonide	-MDI 200 ug/Puff	ก	
- Budesonide + Formoterol	-DPI 4.5+160	ก	
	-DPI Forte 9+320	ก	
- Salmeterol + Fluticasone	-MDI 25/125	ก	
3.3 Leukotriene receptors antagonists			
- Montelukast	-Chew Tab.5 mg	ก	
	-Tab 10 mg	ก	

3.4 Antihistamine

ไม่ควรใช้ antihistamine เป็นประจำในโรคหวัด(common cold)เนื่องจากมีประสิทธิผลไม่แตกต่างจากยาหลอก

- Chlorphenilamine maleate	-Tab 2 mg	ก (ในกล่องยาสามัญประจำบ้าน)
	-Tab 4 mg	ก
	-Syr 2 mg/5 ml	ก
	-Inj 10 mg/ml	ก
- Cetirizine	-Syr 5 mg/5 ml	ก
- Hydroxyzine	-Tab 10 mg	ก
- Loratadine	-Tab 10 mg	ก

3.5 Pulmonary surfactants

3.6 Cough preparation

3.6.1 Cough suppressants

- Dextromethrophan HBr	-Tab 15 mg	ก
-Brown	-Mixt 60 ml	ก

3.6.2 Expectorant and demulcent cough preparations

ยาละลายเสมหะ (mucolytics) ไม่จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากไม่มีประสิทธิผลทางคลินิกที่ชัดเจน

- Ammonium carbonate and sanaga mixture (ยาแก้ไอขับเสมหะสำหรับเด็ก)	-Mixt	ก
Each 5 ml contain		
Ammonium Carbonate	0.02 g	
Glycyrrhiza Fluidextract	0.25 ml	
- Glyceryl guaiacolate	-Syr 100 mg/5 ml	ก
	-Tab 100 mg	ก

3.7 Systemic nasal decongestants

3.8 Other respiratory preparations

-Aromatic Ammonira	-Spirit 450 ml	ก
--------------------	----------------	---

กลุ่มยา 4 Central nervous system

4.1 Hypnotics and anxiolytics

ยานอนหลับ (hypnotics) ไม่จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากควรรักษาที่ต้นเหตุของการนอนไม่หลับ การใช้ยาเกินความจำเป็นมักนำไปสู่ปัญหาการติดยา

- Clonazepam	-Tab 0.5 mg	ข	(P4)
	-Tab 2 mg	ข	(P4)
- Diazepam	-Tab 2 mg	ก	(P4)

ชื่อยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
	-Tab 5 mg	ก	(P4)
	-Ing 10 mg/2 ml	ก	(P4)
- Dipotassium Chlorazepate	-Cap 250 mg	ข	(P4)
- Lorazepam	-Tab 0.5 mg	ก	(P4)
- Hydroxyzine	-Tab 10 mg	ข	
4.2 Drugs used in psychoses and relate disorders			
4.2.1 Antipsychotic drugs			
- Chlopromazine hydrochloride	-Tab 50 mg	ก	
	-Tab 100 mg	ก	
- Clozapine	- Tab.25 mg	ค	
	- Tab 100 mg	ค	
เงื่อนไข			
1. ไม่ใช่เป็นยาตัวแรกในการรักษา			
2. ควรได้รับการวินิจฉัย และการรักษาเบื้องต้น โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์			
- Fluphenazine	- Inj. 25 mg	ก	
	- Inj. 50 mg/2 ml	ก	
- Haloperidol	-Tab 2 mg	ก	
	-Tab 5 mg	ก	
	-Inj 5 mg/ml	ก	
- Perphenazine	-Tab 2 mg	ก	
	-Tab 4 mg	ก	
	-Tab 8 mg	ก	
- Risperidone	- Tab 1 mg	ข	
	- Tab 2 mg	ข	
- Thioridazine	-Tab 10 mg	ข	
	-Tab 25 mg	ข	
	-Tab 100 mg	ข	
4.2.2 Antimatnic drugs			
- Carbamazepine	-Tab 200 mg	ก	
- Lithium Carbonate	- Cap 300 mg	ก	
- Sodium Valproate	-Tab 200 mg	ก	
	-Chrono Tab 500 mg	ข	
4.3 Antidepressant drugs			
- Amitriptyline hydrochloride	-Tab 10 mg	ก	
- Fluoxetine hydrochloride	-Tab 20 mg	ก	
- Nortriptyline	-Tab 25 mg	ก	

ชื่อยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
- Imipramine	- Tab 25 mg	ก	
- Sertraline	- Tab 50 mg	ก	
- Trazodone	-Tab 50 mg	ก	
4.4 Central nervous system stimulants			
- Methylphenidate	-Tab 10 mg	ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 2
4.5 Drugs used in nausea and vertigo			
4.5.1 Drugs used in nausea and vomiting			
- Domperidone	-Tab 10 mg	ก	
	-Sus 5 mg/5 ml	ก	
- Metocloplamide	-Inj 10 mg/2 ml	ก	
4.5.2 Drugs used in vestibular disorders			
- Dimenhydrinate	-Tab 50 mg	ก	
	-Inj 50 mg/ml	ก	
-Betahistine mesylate	-Tab 6 mg	ข	
4.6 Analgesics and antipyretics			
- Paracetamol	-Tab 325 mg	ก	แนะนำให้ใช้เป็น first-line drugs
	-Tab 500 mg		สำหรับ osteoarthritis
	-Syr 120 mg/5 ml		
- Aspirin	-Tab 300 mg	ก	ห้ามใช้ในเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี สำหรับลดไข้ แก้ปวด เพื่อลดความเสี่ยง ต่อการเกิด Reye's syndrome
Aspirin ชนิด EC Tab ดูดซึม ได้ช้าจึงมีการเริ่มต้นออกฤทธิ์ช้า ไม่เหมาะจะนำมาใช้ในข้อบ่งชี้			
-Ibuprofen	-Sus 100 mg/5 ml – 60 ml	ก	
เมื่อมีข้อบ่งชี้ให้ใช้ NSAIDS แนะนำให้ใช้ Ibuprofen เป็นยาขนานแรกสำหรับบรรเทาอาการปวดทาง ทันตกรรม ปวดประจำเดือน ปวดข้อ และปวดกล้ามเนื้อ			
4.7 Analgesics			
4.7.1 Opioid analgesics			
- Methadone hydrochloride	-Syr 10 mg/ml	ก	หมายเหตุ ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
- Morphine sulfate	- Inj 10 mg/ml	ก	หมายเหตุ ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
	- Syr 10 mg/5 ml	ก	หมายเหตุ ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
	- Tab 10 mg	ก	
	- Tab MST 10 mg	ก	
	- Tab MST 30 mg	ก	
	- Cap CR 20 mg	ก	
- Pethidine hydrochloride	-Inj 50 mg/ml	ก	หมายเหตุ ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
- Fentanyl	-Inj.100 ug/2 ml	ก	

ชื่อยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
	-Transdermal Patch 50 ug/Hr		ก
- Tramadol	-Inj. 100 mg/2 ml	ก	
	-Cap 50 mg	ก	
4.7.2 Drugs for neuropathic pain			
- Amitriptyline hydrochloride	-Tab 10 mg	ก	
- Carbamazepine	-Tab 200 mg	ก	
- Nortriptyline hydrochloride	-Tab 25 mg	ก	
- Gabapentin	-Cap 100 mg	ง	
	-Cap 300 mg	ง	
4.7.3 Antimigraine drugs			
4.7.3.1 Drugs for acute migrane attack			
- Paracetamol	-Tab 325 mg	ก	
	-Tab 500 mg	ก	
- Aspirin	-Tab 300 mg	ก	ห้ามใช้ในเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี สำหรับลดไข้แก้ปวด เพื่อลดความเสี่ยง ต่อการเกิด Reye's syndrome
- Ergotamine tartrate+Caffeine	-Tab 1 mg+100 mg	ก	
4.7.3.2 Drugs used in the prophylaxis of migrane			
- Amitriptyline hydrochloride	-Tab 10 mg	ก	
- Propranolol hydrochloride	-Tab 10 mg	ก	
	-Tab 40 mg	ก	
- Sodium valproate	-Chrono Tab 500 mg	ง	ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท
	- Tab 200 mg	ง	
4.8 Antiepileptics			
4.8.1 Drugs used in the control of epilepsy			
- Carbamazepine	-Tab 200 mg	ก	
-Clonazepam	-Tab 0.5 mg	ข (P4)	
	-Tab 2 mg	ข (P4)	
- Magnesium Susfate	-Inj.10% in 10 ml	ก	
	-Inj. 50% in 2 ml	ก	
- Phenobabitol	-Tab 60 mg	ก	
- Phenytoin sodium	-Cap 100 mg	ก	
	-Inj.250 mg/5 ml	ก	
- Sodium valproate	-Chrono Tab 500 mg	ก	
	- Tab 200 mg	ก	
4.8.2 Drugs used in status epilepticus			

ชื่อยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
- Diazepam	-Inj 10 mg/2 ml	ก	
- Phenytoin sodium	-Inj.250 mg/5 ml	ก	
- Midazolam	-Inj.5 mg/ml	ง	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 2
4.9 Drugs used in movement disorders			
- Clonazepam	- Tab 0.5 mg	ข	
	- Tab 2 mg	ข	
- Diazepam	-Tab 2 mg	ก	
	-Tab 5 mg	ก	
- Propranolol hydrochloride	-Tab 10 mg	ก	ใช้สำหรับ essential tremor
	-Tab 40 mg	ก	ใช้สำหรับ essential tremor
- Trihexyphrnydyl hydrochloride	-Tab 2 mg	ก	
	-Tab 5 mg	ก	
4.10 Drugs used in substance dependence			
4.10.1 Drug used in alcohol dependence			
4.10.2 Drug used in smoking cessation			
- Nortriptyline hydrochloride	-Tab 25 mg	ก	
4.10.3 Drug used in opioid dependence			
- Methadone hydrochloride	-Syr 10 mg/ml	ง	ใช้กับผู้ป่วยติดเฮโรอีน
4.11 Drugs used in dementia			
กลุ่มยา 5 Infection			
5.1 Antibacterial drugs			
5.1.1 Penicillins			
- Amoxicillin trihydrate	-Cap 250 mg	ก	
	-Cap 500 mg	ก	
	-Sus 125 mg/5 ml	ก	
-Amoxy-Clav	-Inj.1.2 g	ก	
	-Sus 400+57 mg/5 ml	ก	
	-Tab 875+125 mg	ก	
เงื่อนไข Tab & Syr มี 3 ข้อ			
เงื่อนไข Inj มี 2 ข้อ			
- Ampicillin sodium	-Inj.500 mg	ก	
	-Inj 1 g	ก	
- Cloxacillin sodium	-Inj 1 g	ก	
- Dicloxacillin sodium	-Cap 250 mg	ก	

ชื่อยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
	-Syr 125 mg/5 ml	ก	
- Penicillin V	-Tab 125 mg	ก	
	-Tab 250 mg	ก	
- Penicillin G	-Inj 5 mu	ก	
- Penicillin Benzathine	-Inj.2.4 mu	ก	
- Piperacillin sodium + Tazobactam sodium	-Inj.4.5 g	ง	
5.1.2 Cephalosporins,cephamycins,and other beta-lactams			
-Cephalexin	-Cap 500 mg	ก	
	-Syr 125 mg/5 ml	ก	
มีเงื่อนไข			
-Cefazolin sodium	-Inj.1 g	ก	
มีเงื่อนไข			
- Ceftriazone sodium	-Inj 1 g	ก	
			1. ใช้สำหรับ serious community acquired bacterial infection ยกเว้นการติดเชื้อ Pseudomonas aeruginosa
			2. ใช้สำหรับ gram-negative meningitis ยกเว้นในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี
			3. ใช้สำหรับการติดเชื้อ Penicillin Resistant , S.pneumoniae (PRSP)
			4. ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบบางกรณีในผู้ป่วยที่ไตทำงานบกพร่องซึ่งไม่สามารถใช้ยาในกลุ่ม aminoglycosides ได้
			5. ใช้สำหรับการติดเชื้อ Gonococcus
			6.
- Ceftazidime	-Inj 1 g	ก	
มีเงื่อนไข			
5.1.3 Tetracyclines			
- Doxycycline	-Cap 100 mg	ก	
5.1.4 Aminoglycosides			
- Gentamycin sulfate	-Inj 80 mg/2 ml	ก	
5.1.5 Macrolides			
- Azithromycin	-Sus 200 mg/5 ml in 15 ml	ง	
- Erythromycin Estolate	-Sus 125 mg/5 ml	ก	
- Erythromycin Stearate	-Sus 125 mg/5 ml	ก	
- Roxitromycin	-Tab 150 mg	ก	
5.1.6 Quinolone			
- Norfloxacin	-Tab 400 mg	ก	

ชื่อยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
- Ofloxacin	-Tab 200 mg	ข	ใช้เป็นยาแทนใช้สำหรับการติดเชื้อ แบคทีเรียแกรมลบ หมายเหตุ จัดเป็นบัญชี ค เมื่อใช้เป็น second line drug ในการ รักษาวัณโรค
- Ciprofloxacin hydrochloride	-Tab 500 mg	ง	
มีเงื่อนไข			
- Levofloxacin	-Tab 500 mg	ง	
มีเงื่อนไข			
5.1.7 Some other antibacterials			
-Clindamycin	-Inj.600 mg/4 ml	ข	
	-Cap 300 mg	ข	
มีเงื่อนไข			
- Metronidazole	-Tab 400 mg	ก	
	-Inj 500 mg/100 ml	ก	
5.1.8 Sulphonamides and trimethopin			
- Co-trimoxazole	-Tab	ก	
	Each Tablet contain Sulfamethoxazole 400 mg+Trimethoprim 80 mg		
	-Sus 60 ml	ก	
	Each 5 ml contain Sulfamethoxazole 200 mg+Trimethoprim 40 mg		
5.1.9 Antituberculous drugs			
- Ethambutol hydrochloride	-Tab 400 mg	ก	
	-Tab 500 mg	ก	
- Isoniazid	-Tab 100 mg	ก	
- Isoniazid+Rifampicin	-	ข	
- Isoniazid+Rifam+PZA+Etham	-	ข	
- Pyrazinamide	-Tab 500 mg	ก	
- Rifampicin	-Cap 300 mg	ก	
	-Tab 450 mg	ก	
- Steptomycin sulfate	-Inj 1 g	ก	
- Ofloxacin	-Tab 200 mg	ก	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก 5.1.6
5.1.10 Antieprotic drugs			
- Dapsone	- Tab 100 mg	ก	
5.2 Antifungal drugs			
- Fluconazole	-Cap 200 mg	ก	
	ใช้สำหรับ invasive fungal infection บางชนิด		
	ใช้สำหรับ dermatomycoses		

ชื่อยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
- Griseofuvin	-Tab 500 mg	ก	
- Ketoconazole	-Tab 200 mg	ก	

5.3 Antiviral drugs

5.3.1 Non-antiretrovirals

Acyclovir ชนิด Topical (Acyclovir cream) ไม่จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากมีประสิทธิผลต่ำและไม่แนะนำให้ใช้

- Acyclovir	-Tab 200 mg	ก	<p>1. ใช้สำหรับการติดเชื้อไวรัส varicella-zoster และ hepes simplex ในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง</p> <p>2. ใช้รักษาและควบคุม recurrent herpes simplex infection ที่รุนแรง ในผู้ป่วยปกติ</p> <p>3. ใช้สำหรับการติดเชื้อ herpes zoster ใน</p> <p>4. ใช้สำหรับโรคอีสุกอีใสใน</p> <p>แนะนำให้ใช้สำหรับเด็ก เพราะ</p> <p>เสี่ยงจากโรคไม่รุนแรง</p>
ผู้ป่วยปกติ ผู้ใหญ่ ไม่ อาการข้าง			
- Lamivudine(3TC)	-Tab 150 mg	ง	<p>1. ใช้สำหรับ chronic hepatitis B ทั้ง HBeAg positive และ Negative โดยมีระดับ ALT สูงกว่าปกติ 2 เท่า เป็นเวลา 6 เดือน มี HBV DNA มากกว่า 100,000 copies/ml และมีผล liver histology ที่แสดง necroinflammation HAI Scor มากกว่าหรือเท่ากับ 3</p> <p>2. ใช้สำหรับ compensated และ decompensated cirrhosis ที่มี HBV DNA มากกว่า 10,000 copies/ml</p>

หมายเหตุยา Lamivudine Tab.150 mg

ระดับ ALT ที่ผิดปกติต้องวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆที่ทำให้ ALT สูงกว่าปกติ เช่น fatty liver, drug-induced hepatitis

- Oseltamivir	-Cap 30 mg	จ (1)
	-Cap 45 mg	
	-Cap 75 mg	

ใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อมรับมือปัญหาโรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ของประเทศ

5.3.2 Antiretrovirals

ยากุ่มนี้เป็นยาตามนโยบายเอดส์แห่งชาติของกรมควบคุมโรค สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ชื่อยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
- Didanosine (ddl)	-	จ (1)	
- Efaviranz	-Cap 200 mg	จ (1)	
	-Tab 600 mg	จ (1)	
- Indinavir sulfate	-Cap 400 mg	จ (1)	
- Lamivudine(3TC)	-Tab 150 mg	จ (1)	
- Lamivudine+Nevirapine+ Stavudine (GPO-VIR-S-30)	-Tab (150 mg+200 mg+30 mg)	จ (1)	
- Nevirapine mesilate	-Tab 200 mg	จ (1)	
	-Sus 10 mg/ml	จ (1)	
- Ritonavir	-Cap 100 mg	จ (1)	
- Stavudine	-Cap 30 mg	จ (1)	
	-Cap 40 mg	จ (1)	
- Zidovudine (AZT)	-Cap 100 mg	จ (1)	
	-Cap 300 mg	จ (1)	
	-Syr 100 mg/5 ml	จ (1)	
- Lamivudine+Zidovudine (Zilanvir)	-Tab (150 mg+300 mg)	จ (1)	
5.4 Antiprotozoal drugs			
5.4.1 Antimalarials			
- Artesunate	-Tab 50 mg	ก	ใช้รักษามาเลเรียตามข้อกำหนดใน แนวทางการบำบัดรักษาหรือการใช้ยา ฉบับปัจจุบันของ กรมต. สธ.
- Chloroquine phosphate	-Tab 250 mg	ก	
- Primaquine phosphate	-Tab 15 mg	ก	
- Quinine	-Tab 300 mg	ก	
- Mefloquine HCl	- Tab	ก	
5.4.2 Other antiprotozoal drugs			
- Metronidazole	-Tab 400 mg	ก	ใช้สำหรับ amoebiasis, giardiasis และ urogenital trichomoniasis
	-Inj 500 mg/100 ml		
5.5 Anthelmintics			
- Albendazole	-Tab 200 mg	ก	
	-Sus 400 mg/20 mg	ก	
- Diethylcarbamazepine citrate	-Tab 300 mg	ก	
5.6 Antiseptics			
- Chlorhexidine Gluconate	-Scrub 4% Gall	ก	
- Ethyl alcohol	-Sol 70% 60 ml	ก	

ชื่อยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
	-Sol 70% 450 ml	ก	
	-Sol. 95% 450 ml	ก	
	-Gel 400 g	ก	
- Hydrogen peroxide	-Sol 450 ml	ก	
- Povidine-iodine	-Sol 10% gall	ก	
	-Sol 10% 15 ml	ก	
	-Scrub 7.5% gall	ก	

กลุ่มยา 6 Endocrine system

6.1 Drugs used in diabetes

6.1.1 Insulin

- Isophane insulin (NPH)	-Penfill Inj 300 u/3 ml	ก
	-Inj.1000 u/10 ml	ก
- Regular insulin (Neutral Insulin)	-Inj 1000 u/10 ml	ก
- Mixtard insulin (Biphasic Isophane) (NPH+RI)	-Penfill Inj 300 u/3 ml	ก

6.1.2 Oral antidiabetic drugs

- Glipizide	-Tab 5 mg	ก
- Metformin hydrochloride	-Tab 500 mg	ก
- Pioglitazone HCl	-Tab 30 mg	ง

6.2 Thyroid and antithyroid drugs

6.2.1 Thyroid hormone

- Levothyroxine sodium (L-thyroxine sodium)	-Tab 0.1 mg	ก
--	-------------	---

6.2.2 Antithyroid drugs

- Propylthiouracil	-Tab 50 mg	ก
- Thiamazole (Methimazole)	-Tab 5 mg	ก

6.3 Corticosteroids

- Dexamethasone	-Inj 4 mg/ml	ก
	-Tab 4 mg	ก
- Hydrocortizone	-Inj. 100 mg	ก
- Prednisolone	-Tab 5 mg	ก
- Methylprednisolone	-Inj.1 g	ก
- Triamcinolone HCl	- Inj. 10 mg/ml	ก

6.4 Sex hormones

6.4.1 Female sex hormones

- Norethisterone	-Tab 5 mg	ก
- Hydroxyprogesterone Caproate	-Inj 250 mg/ml	ข

6.4.2 Male sex hormones and antagonists

6.5 Hypothalamic and pituitary hormones

6.5.1 Hypothalamic and anterior pituitary hormones

6.5.2 Posterior pituitary hormones and antagonists

6.6 Drugs affecting bone metabolism

- Alendronate	-Tab 70 mg	ง
---------------	------------	---

6.7 Other endocrine drugs

6.7.1 Bromocriptine and other dopaminergic drugs

6.7.2 Drugs affecting gonadotropins

กลุ่มยา 7 Obstetrics, gynaecology, and urinary-tract disorders

7.1 Drugs used in obstetrics

7.1.1 Prostaglandins, prostaglandins and oxytocics

- Methylergometrin maleate	-Inj 0.2 mg/ml	ก
- Oxytocin	-Inj 10 u/ml	ก
- Sulprostone	-Inj 500 ug	ง

ใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วย severe post partum hemorrhage

7.1.2 Myometrial relaxants

- Terbutaline sulfate	-Inj 0.5 mg/ml	ก
-----------------------	----------------	---

7.2 Treatment of vaginal and vulval conditions

- Clotrimazole	-Vaginal tab 100 mg	ก
----------------	---------------------	---

7.3 Contraceptives

- Etonogestrel	- Implant 1 rod 68 mg	ก
- Ethinylestradiol+Levonorgestral	-Tab (0.03 mg+0.15 mg)	ก
- Medroxyprogasterrone acetate	-Inj 150 mg/3 ml	ก

7.4 Drugs for genito-urinary disorders

7.4.1 Drugs for benign prostatic hyperplasia

- Alfuzosin	-SR Tab 10 mg	ก
- Doxazosin	-Tab 2 mg	ก
- Finasteride	- Tab 5 mg	ง

7.4.2 Drugs for urinary frequency , enuresis , and incontinence

7.4.3 Drugs used in alkalimisation of urine

กลุ่มยา 8 Malignant disease and Immunosuppression

8.1 Cytotoxic drugs

8.1.1 Alkylating drugs

8.1.2 Cytotoxic antibiotics

8.1.3 Antimetabolites

8.1.4 Vinca alkaloids and etoposide

8.1.5 Other antineoplastic drugs

8.2 Drugs affecting the immune response

- Dexamethasone	-Inj 4 mg/ml	ก
- Prednisolone	-Tab 5 mg	ก

8.3 Sex hormones and hormone antagonists in malignant disease

8.3.1 Progestogens , anti-estrogens and enzyme inhibitors

8.3.2 Gonadorelin analogues

กลุ่มยา 9 Nutrition and blood

9.1 Whole blood,blood products and drugs used in some blood disorders

9.1.1 Whole blood and blood products

9.1.2 Drugs used in hypoplastic,haemolytic and renal anaemias

- Folic acid	-Tab 5 mg	ก
--------------	-----------	---

9.1.3 Drugs used in bone marrow transplantation

9.2 Fluids and electrolytes

- Potassium chloride	-Elixir	ก
	-Inj 20 meq/10 ml (1.5 g)	ก
	- Tab 500 mg	ก
- LRS	-1000 cc	ก
- D-5-S	-1000 cc	ก
- D-5-1/2-S	-500 cc	ก
	-1000 cc	ก
- D-5-1/3-S	-500 cc	ก
- D-5-1/4-S	-500 cc	ก
- D-5-1/5-S	-500 cc	ก
- D-5-W	-100 cc	ก
	-500 cc	ก
	-1000 cc	ก

ชื่อยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
- D-10-1/2-S	-1000 cc	ก	
- D-10-W	-500 cc	ก	
- Sodium bicarbonate	-Tab 300 mg (3.57 meq)	ก	
	-Inj 7.5% 50 ml (44.6 meq)	ก	
	- Mix 60 ml	ก	
- Sodium Chloride	- Tab 300 mg	ก	
- Sterile water for injection	- Inj 10 ml	ก	
	- Inj 100 ml	ก	
	- Irrigation 1000 ml	ก	
- NSS 0.45 %	-1000 cc	ก	
- NSS 0.9%	-1000 cc	ก	
	-Irrigation 1000 cc	ก	
- NSS 3%	- 500 cc		
- Calcium polystyrene sulfonate	-Oral Pdr 5 g	ข	
9.3 Vitamins			
- Folic Acid	-Tap 5 mg	ก	
- Vitamin B6	-Tab 50 mg	ก	
- Vitamin B complex	-Tab	ก	หมายเหตุ ปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันในเด็กอายุ 9-12 ปี และผู้ใหญ่
	Each Tablet contain		
	Vitamin B1 5 mg		
	Vitamin B2 2 mg		
	Vitamin B6 2 mg		
	Nicotinamide 20 mg		
- Vitamin B.CO	-Inj	ข	ประกอบด้วย Vitamin B1, B2, B6 และ Niacinamide
	Each ml contain		
	Vitamin B1 100 mg		
	Vitamin B2 0.5 mg		
	Vitamin B6 1 mg		
	Niacinamide 100 mg		
- Vitamim D2	-Cap 20,000 U	ก	
- Vitamin K1	-Inj 1 mg/0.5 ml	ก	
- Multivitamins	-Syr 60 ml	ก	หมายเหตุ มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันในเด็กอายุ 1-3 ปี
	Each 5 ml Contain		
	Vitamin A 1990 iu		
	Vitamin D 150 iu		
	Vitamin C 35 mg		

Vitamin B1	1 mg		
Vitamin B2	1 mg		
Vitamin B6	1 mg		
Vitamin B12	2.5 ug		
Calcium panthotenate	5 mg		
Folic	0.1 mg		
Nicotinamide	10 mg		
Vitamin E	7.5 mg		
- Multivitamins	-Tab		ก หมายถึง มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันในเด็กอายุ 9-12 ปี และผู้ใหญ่
Each tablet contain			
Vitamin A	2500 iu		
Vitamin D	300 iu		
Vitamin B1	1 mg		
Vitamin B2	0.5 mg		
Vitamin C	15 mg		
Nicotinamide	7.5 mg		
-MTV Syr ชนิดผสมธาตุเหล็ก	-Syr 120 ml		
Each 15 ml contain			
Ferric Ammonium Citrate (Eq to Ferric	70.95 mg)		
Vit B1	5 mg		
Vit B2	2 mg		
Vit B6	5 mg		
Vit B12	12.5 mcg		
Nicotiamide	25 mg (Niacin or Vitamin B3)		
Calcium Pantothenate	5 mg		
-Triferdine Tab. ยาเม็ดเสริมไอโอดีน	-Tab		
Each Tablet Contain			
Iodine	0.15 mg		
Ferrous	60.81 mg		
Folic	0.40 mg		

9.4 Intravenous nutrition

9.5 Minerals

- Calcium carbonate	-Tab 1000 mg (Ca 400 mg)	ก
- Calcium gluconate	-Inj 10% 10 ml (4.5 meq)	ก
- Ferrous Fumarate	-Tab 200 mg (Fe 66 mg)	ก
- Magnesium hydroxide (MOM)	-Sus 8% 60 ml	ก

ชื่อยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
--------	--------	-------	----------

- Magnesium sulfate	-Inj 50% 2 ml (8.1 meq)	ก	
	-Inj 10% 10 ml (8.1 meq)	ก	

9.6 Vitamin and minerals for pregnancy and lactating mothers

-Ferrous fumarate	-Tab 200 mg	ก	
-Folic Acid	-Tab 5 mg	ก	
-Triferdine	- Tab	ก	

กลุ่มยา 10 Musculoskeletal and joint diseases

10.1 Drugs used in rheumatic diseases and gout

10.1.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs

- Aspirin	-Tab 81 mg	ก	ไม่ใช่สำหรับโรค gout
	-Tab 300 mg	ก	
- Diclofenac sodium	-Tab 25 mg	ก	
	-Inj 75 mg/3 ml	ก	
- Ibuprofen	-Sus 100 mg/5 ml -60 ml	ก	
- Indomethacin	-Cap 25 mg	ก	
- Naproxen	-Tab 250 mg	ก	

10.1.2 Disease-modifying antirheumatic drugs(DMARDs)

- Chloroquine phosphate	-Tab 250 mg	ข	
-------------------------	-------------	---	--

10.1.3 Drugs for treatment of gout and hyperuricaemia

- Colchicine	-Tab 0.6 mg	ก	
- Allopurinol	-Tab 100 mg	ก	ห้ามใช้รักษา acute gout

10.2 Drugs used in neuromuscular disorders

10.2.1 Drugs which enhance neuromuscular transmission

10.2.2 Skeletal muscle relaxants

1. ยากลุ่มนี้ใช้บรรเทาอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อที่เป็นรุนแรงในโรคบางชนิด เช่น บาดทะยัก การบาดเจ็บของไขสันหลัง และ multiple sclerosis

2. ไม่ใช่ยากลุ่มนี้กับอาการหดเกร็งกล้ามเนื้อเนื่องจากการเล่นกีฬาหรือการบาดเจ็บ

3. ควรใช้ยากลุ่มนี้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการลด muscle tone อาจเพิ่ม disability ให้กับผู้ป่วย

- Diazepam	-Tab 2 mg	ก	
	-Tab 5 mg	ก	
	- Inj 10 mg/2 ml	ก	

10.3 Drugs for relief of soft-tissue inflammation

10.3.1 Rubifacients

-Methylsalicylate	- Cream Compound	ก	
-------------------	------------------	---	--

กลุ่มยา 11 Eye**11.1 Anti-infective eye preparation****11.1.1 Antibacterials and eye wash solution**

- Chloramphenicol	-Eye drop 0.5% 10 ml	ก
	-Eye oint 1% 5 g	ก
- Polymyxin B sulfate+	-Eye drop 5 ml	ก

Neomycin sulfate+Gramicidin

Each ml contain

Polymyxin B sulfate	5000 u
Neomycin sulfate	1.75 mg
Gramicidin	0.025 mg

11.1.2 Antibacterials with corticosteroids

- 1.การใช้ยาในกลุ่มนี้ควรอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญ เพราะยาที่มีใช้จำกัด หากใช้ไม่ถูกต้องอาจไม่ปลอดภัย
- 2.ห้ามใช้ในตาแดงที่ยังมิได้รับการตรวจวินิจฉัยสาเหตุที่ชัดเจน เพราะอาจเกิดอันตรายได้ เช่น การใช้ในตาแดงที่เกิดจากเชื้อ herpes simplex virus อาจทำให้เกิดแผลที่กระจกตาไปจนถึงตาบอดได้ เป็นต้น
- 3.ใช้สำหรับกรอกเสกที่รุนแรงในลูกตาส่วนหน้าหรือหลังผ่าตัด และป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มเสี่ยง

- Dexamethasone sodium	-Eye drop 4 ml	ก
phosphate+Neomycin sulfate	(Dex-Oph)	

Each ml contain

Dexamethasone	1 mg
Neomycin sulfate	3.5 mg

11.1.3 Antifungals**11.1.4 Antivirals****11.2 Corticosteroids and other anti-inflammatory preparation**

- Antazoline hydrochloride+	-Eye drop 5 ml	ก
Tetrahydrozoline	(Hista-Oph)	

Hydrochloride

Composition

Antazoline HCl	0.05 %
Tetrahydrozolin HCl	0.04 %

11.3 Mydriatics and cycloplegics

-Tropicamide	-Eye drop 2% 15 ml
--------------	--------------------

11.4 Drugs for treatment of glaucoma**11.5 Local anaesthetics**

- Tetracaine hydrochloride	-Eye drop 0.5% 15 ml	ก ห้ามให้ผู้ป่วยนำกลับบ้าน
----------------------------	----------------------	----------------------------

11.6 Tear deficiency , ocular lubricants and astringents

11.7 Ocular diagnostic and peri-operative preparations

กลุ่มยา 12 Ear,nose,and oropharynx

12.1 Drugs acting on the ear

12.2 Drugs acting on the nose

12.2.1 Drugs used in nasal allergy

-Fluticazone Deca -Nasal Spray ง

12.2.2 Topical nasal decongestants

12.3 Drugs acting on the oropharynx and oral cavity

12.3.1 Drugs used in treatment of oral ulcer

- Borax(in glycerin) -Sol 450 ml ก

Each 100 g contain

Borax 12 g

Glycerin 88 g

-Triamcinolone -Oral Paste ก

12.3.2 Oropharyngeal antifungal drugs

12.3.3 Antiseptics for root canal treatment

12.3.4 Drugs used in prevention and treatment of dental plaque and caries

12.3.5 Other dental preparations

-Adrenalin -Inj 1:1000 ก

กลุ่มยา 13 Skin

13.1 Anti-infective skin preparation

13.1.1 Antibacterial preparations

-Silver Sulfadiazine -Cream ก

13.1.2 Antifungal preparations

- Benzoic acid+Salicylic acid -Oint 5 g (6%+3%) ก

(whitfield's ointment)

- Clotrimazole -Cream 1% 5 g ก

- Mupirocin -Oint 2% 5 g ข

13.1.3 Parasitocidal preparation

- Benzyl benzoate -Emul 25% w/v 450 ml ก

13.2 Emollient and barrier preparation

- Olive oil -Oil 450 ml ก

- White petrolatum -Oint(hosp) ก

ชื่อยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
(White Wasaline)			
- Zinc Oxide	-Paste 7.5% 5 g	ก	
13.3 Topical antipruritics			
- Calamine	-Lotion 60 ml	ก	
contain			
Calamine	15 % w/v		
Zinc Oxide	5% w/v		
- Prednisolone	-Cream 0.5% 5 g	ก	
- Betamethasone valerate	-Cream 0.1% 5 g	ก	
- Triamcinolone acetonide	-Cream 0.1% 5 g	ก	
	-Cream 0.02% 5 g	ก	
	-Lotion 30 ml	ก	
13.4 Topical corticosteroids			
-Prednisolone	-Cream 0.5% 5 g	ก	
-Betamethasone	-Cream 0.1% 5 g	ก	
-Triamcinolone	-Cream 0.1% 5 g	ก	
	-Cream 0.02% 5 g	ก	
	-Lotion 30 ml	ก	
13.5 Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)			
13.6 Preparation for warts and calluses			
-Salicylic Acid+Phenol	-25%+1.5% Sol 15 ml	ก	
กลุ่มยา 14 Immunological products and vaccines			
- Anti-D Immunoglobulin	-Inj 1500 u/2 ml	ก	
- Hepatitis B Immunoglobulin	-Inj 180 u/ml	ก	
- Rabies Immunoglobulin ,ERIG	-Inj 200 u/ml in 5 ml	ก	
- Rabies Immunoglobulin,HRIG	-Inj 300 u/2 ml	ก	
- TRCS Verorab	-Inj 0.5 ml	ก	สำหรับ Post exposure protection ค (กรณี Pre exposure protection)
- Tetanus Antitoxin Horse	-Inj 1500 u/ml	ก	
- วัคซีนอื่นๆ ของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กรมควบคุมโรค			
กลุ่มยา 15 Anasesthesia			
15.1 General anaesthesia			
15.1.1 Intravenous anaesthetics			

ชื่อยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
- Propofol	-Inj.1% 10 mg/ml in 20 ml	ก	
15.1.2 Inhalational anaesthetics			
15.1.3 Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs)			
15.1.4 Sedative and analgesic peri-operative drugs			
- Diazepam	-Tab 2 mg	ก	
	-Tab 5 mg	ก	
	-Inj 10 mg/2 ml	ก	
- Fentanyl	-Inj	ก	หมายเหตุ ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
- Midazolam	-Inj	ก	ง วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2
- Morphine sulfate	-Inj 10 mg/ml	ก	หมายเหตุ ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
	-Syr 10 mg/5 ml	ก	หมายเหตุ ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
- Pethidine hydrochloride	-Inj 50 mg/ml	ก	หมายเหตุ ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
15.1.5 Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anaesthesia			
- Atropine sulfate	-Inj 0.6 mg/ml	ก	ใช้แก้ฤทธิ์ยาห่อนกล้ามเนื้อ
15.2 Local anaesthesia			
- Lidocaine hydrochloride	-Viscous 2% (20 mg/ml) 100 ml	ก	
	-Gel 2% 30 g	ก	
	-Inj 2% 50 ml (20 mg/ml)	ก	
- Lidocaine hydrochloride+	-Inj 2% c Adr 1:80,000 50 ml	ก	
Epinephrine			
Each ml contain			
	Lidocaine HCl	20 mg	
	Adrenaline	0.0125 mg	
กลุ่มยา 16 Antidotes			
ยาในกลุ่มนี้หลายชนิดไม่ปรากฏเป็นยาในบัญชีนี้ เนื่องจากเป็นยากำพร้า(orphan druge)ที่มีปัญหาการจัดหาและไม่มีทะเบียนตำรับยาแต่ควรส่งเสริมให้มีการจัดหามาใช้และควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้			
- Antivenom sera(งูเห่า)	-Inj	ก	
- Antivenom sera(งูกะปะ)	-Inj	ก	
- Atropine sulfate	-Inj 0.6 mg/ml	ก	ใช้ถอนพิษ organophosphate insecticides,cholinesterase inhibitors และ cholinergic agent(เช่น เห็ดพิษ neostigmine, pilocarpine เป็นต้น)

ชื่อยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
- Calcium gluconate	-Inj 10% 10 ml (4.5 meq)	ก 1. ใช้รักษาพิษที่เกิดจาก calcium channel blockers และ hydrofluoric acid 2. ให้ฉีดเข้าเส้นเลือดอย่างช้าๆ การฉีดเร็วอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้	
- Charcoal,activated	-Pdr 50 g	ก ใช้ดูดซับสารพิษ	
- Diazepam	-Inj 10 mg/2 ml	ก	
- Naloxone hydrochloride	-Inj 0.2 mg/ml	ก ใช้ถอนพิษฝิ่นและ clonidine	
- Sodium bicarbonate	-Inj (เฉพาะ 44.6 meq) 3.75 g/50 ml	ก ใช้แก้พิษที่เกิดจาก salicylate, tricyclic antidepressant, antiarrhythmic type I และใช้เป็น urine alkalization	
-Vitamin K1 (Phytomenadione)	-Inj 1 mg/0.5 ml	ก	

กลุ่มยา 17 Contrast medias and Radiopharmaceuticals

17.1 X-ray contrast medias,iodinated

17.1.1 Drugs used in urography and computed tomography

17.1.2 Drugs used in angiography

17.1.3 Drugs used in myelography

17.1.4 Drugs used in cardiovascular catheterization

17.1.5 Drugs used in Intracavitary, Hysterosalpingography (HSG) , Urethrography , Voiding cystourethrography

17.2 X-ray contrast medias , non-iodinated

17.3 Magnetic resonance imaging contrast medias (MRI diagnostic agents)

17.4 Radiopharmaceuticals

ชื่อยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนงาย
รายการยาจากสมุนไพร			
ยาเถาวัลย์เปรียง	แคปซูล 500 mg	บัญชี 1(1.1)	2
ยาเบญจกูล	แคปซูล 400 mg	บัญชี 1(1.1)	3
ยาแก้ไอมะขามป้อม	ยาน้ำ 120 ml	บัญชี 1(1.1)	8
ยาไฟล	ครีม 30 g	บัญชี 1(1.1)	12
ยาขมิ้นชัน	แคปซูล 500 mg	บัญชี 1(1.1)	15
ยาจันทลีลา	แคปซูล 500 mg	บัญชี 1(1.1)	18
ยาธาตุนคร	แคปซูล 500 mg	บัญชี 1(1.1)	24
ยาธาตุนคร	ยาน้ำ 120 ml	บัญชี 1(1.1)	25
ยาบำรุงโลหิต	แคปซูล 500 mg	บัญชี 1(1.1)	28
ยาประคบสมุนไพร	ลูกประคบ	บัญชี 1(1.1)	29
ยาประสมมะแว้ง	ลูกกลอน 200 mg	บัญชี 1(1.1)	34
ยาปราบชมพูทวีป	แคปซูล 500 mg	บัญชี 1(1.1)	35
ยาฟ้าทะลายโจร	แคปซูล	บัญชี 1(1.1)	38
ยามะขามแขก	แคปซูล	บัญชี 1(1.1)	39
ยาร่วงทางจระเข้	เจล	บัญชี 1(1.1)	44
ยาสารสกัดผงฟ้าทะลายโจร	** บริจาค **		48
ยาเพชรสังฆาต	แคปซูล	บัญชี 1(1.1)	49
ยาชงหญ้าหนวดแมว	ยาชง	บัญชี 1(1.1)	55
ยาหอมเทพจิตร	ยาเม็ด 200 mg	บัญชี 1(1.1)	56
ยาหอมนวโกฐ	ยาเม็ด 200 mg	บัญชี 1(1.1)	59
ยาชิง	แคปซูล	บัญชี 1(1.2)	67
ยาธรณีสังฆาต	แคปซูล 500 mg	บัญชี 1(1.2)	68
ยาประสะไฟล	แคปซูล 500 mg	บัญชี 1(1.2)	72
ยาสหัสธารา	แคปซูล 500 mg	บัญชี 1(1.2)	77
ยาทำลายพระสุเมรุ	แคปซูล	บัญชี 2	86
ยาสุขไสยาสน์	ยาผง	บัญชี 2	88
ยาน้ำมันกัญชา	เย็บในช่องปาก	บัญชี 3	91

รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

กลุ่มยา 1 Gastro-intestinal system

- Alum-Mag Sus -Sus 240 ml
 - Each 15 ml contain
 - Aluminum hydroxide 918 mg
 - Magnesium hydroxide 300 mg
 - Simethicone 60 mg
- Sodium Chloride -Enema 15% 100 ml

กลุ่มยา 2 Cardiovascular sydstem

กลุ่มยา 3 Respiratory system

- Acetylcysteine -Pdr 200 mg , 3 g
- Carbocysteine -Syr 100 mg/5 ml

กลุ่มยา 4 Central nervous system

- Tolperisone HCl -Tab 50 mg

กลุ่มยา 5 Infections

- Erythromycin -Tab/Cap 250 mg
- Chlorhexidine acetate -Gauze Dressing 0.5%
- Salicylic Acid+Phenol -Sol 25%+1.5% 15 ml
- Selenium Sulfide -Lotion 2.5% 60 ml
- Cefdinir -Sus 125 mg/5 ml in 30 ml

กลุ่มยา 6 Endocrine system

กลุ่มยา 7 Obstetrics, gynaecology, and urinary-tract disorders

- Misoprostol -Tab 140 ug

กลุ่มยา 8 Malignant disease and immunosuppression

กลุ่มยา 9 Nutrition and blood

- FBC -Tab
 - Each Tablet contain
 - Ferrous fumarate 200 mg
 - Copper sulfate 2.5 mg
 - Dibasic Cal phosphate 200 mg
 - Ascorbic Acid 25 mg
 - Vitamin D3 200 iu
 - Thiamine mononitrate 5 mg
 - Pyridoxine HCl 2.5 mg

ชื่อยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
Riboflavin	2.5 mg		
Cyanocobalamin	7.5 ug		
Niacinamide	10 mg		
Folic acid	200 ug		

-Gelofusine -Sol 500 ml

กลุ่มยา 10 Musculoskeletal and joint diseases

- Tolperisone HCl -Tab 50 mg

กลุ่มยา 11 .Eye

- Oxytetracycline -Eye Oint 3.5 g

Each g contain

Oxytetracycline 0.5%

Polymyxin B 10,000 u

กลุ่มยา 12 Ear, nose, and oropharynx

กลุ่มยา 13 Skin

กลุ่มยา 14 Immunological products and vaccines

กลุ่มยา 15 Anaesthesia

กลุ่มยา 16 Antidotes

กลุ่มยา 17 Contrast media & Radiopharmaceuticals

ยาสมุนไพรที่เป็นยา นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

- ยาแก้ไอมะแว้งชนิดน้ำ -Syr 60 ml
 - ยาสเปรย์หูกุ้งดอกขาว -Spray